

Clonazepam (Rivotril)

Toedieningsvormen

Druppels, injectie, tabletten

Toepassing

Clonazepam is geregistreerd voor behandeling van epileptische aanvallen. Artsen schrijven het ook voor bij rusteloze benen (restless legs) of (slaap)schokken en dystonie.

Werking

Clonazepam remt de zenuwbanen in het ruggenmerg en hersenen en maakt ze minder prikkelbaar, waardoor een epilepsieaanval wordt gestopt en verkrampde spieren verslappen.

Bijwerkingen

Vooraf in het begin sufheid, slaperigheid, spierslapte, hoofdpijn, duizeligheid en dubbelzien. Vaak neemt dit na één tot twee weken af. Bij kinderen en ouderen kunnen soms rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressief gedrag en nachtmerries ontstaan.

Bijzonderheden

- Alcohol en clonazepam versterken elkaars versuffende effect. Dit geldt ook voor andere middelen die versuffend werken.
- Omdat clonazepam langdurig werkt, heeft het ook een langdurige invloed op de rijvaardigheid. U mag 72 uur na inname niet autorijden.
- U moet het gebruik langzaam afbouwen, in overleg met de arts, omdat anders een epilepsieaanval kan ontstaan. Ook dystoniepatiënten die niet eerder epilepsie hebben gehad, kunnen deze bijwerking krijgen.