

Clozapine (clozapine, Laponex)

Toedieningsvorm

Tabletten

Toepassing

Clozapine is geregistreerd voor schizofrenie en psychotische aandoeningen bij de ziekte van Parkinson. Artsen schrijven het ook voor bij bewegingsstoornissen, manie, depressie en onrust en ook bij verschillende vormen van dystonie. Een belangrijk voordeel van clozapine is dat het veel minder bewegingsstoornissen veroorzaakt dan de andere middelen uit deze groep.

Werking

Clozapine vermindert het effect van dopamine in de hersenen. Daarnaast beïnvloedt het de hoeveelheid van een aantal andere boodschapperstoffen. In tegenstelling tot andere antipsychotica heeft clozapine slechts een zwak antidopaminerg effect.

Bijwerkingen

Slaperigheid, moeheid, duizeligheid en obstipatie komen regelmatig voor. Zeer zelden: ernstige hartritmestoornissen. Een kenmerkende bijwerking van clozapine is het risico van granulocytopenie en agranulocytose, voornamelijk in de eerste 18 weken van de behandeling. Dit betekent dat het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes sterk is verlaagd, waardoor het afweersysteem minder goed werkt. Dit kan een fatale afloop hebben.

Bijzonderheden

- Voor en tijdens de behandeling met clozapine moet het aantal witte bloedlichaampjes gecontroleerd worden. Bij de start van de behandeling en wanneer u een infectie heeft, moet dat wekelijks gebeuren, later maandelijks.
- Wanneer u gewend bent koffie (coffeïne) te drinken en daarmee stopt, kan de hoeveelheid clozapine in het bloed met 50 procent verminderen. Vertel het uw arts als u uw koffiegewoonte wilt veranderen, zodat hij de dosis clozapine kan verhogen.
- Abrupt stoppen met roken leidt tot een verhoging van de hoeveelheid clozapine in het bloed. Vertel het uw arts als u wilt stoppen, zodat hij de dosis clozapine kan verlagen.
- Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. U mag de eerste dagen dat u het gebruikt niet autorijden. Alcohol of andere medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden versterken dit effect.