

Haloperidol (Haldol, haloperidol)

Toedieningsvormen

Injectie, druppels, tabletten

Toepassing

Haloperidol is geregistreerd voor psychosen, ernstige vormen van opwinding en angst, manie, tics en onregelmatige, krampachtige bewegingen van spieren of spiergroepen, misselijkheid en braken (uitgezonderd braken bij reisziekte). Daarnaast schrijven artsen het voor bij dementie, dwangstoornissen en hik. Ook wordt het bij jonge patiënten met gegeneraliseerde dystonie toegepast, soms in combinatie met pimozide. Artsen schrijven haloperidol ook voor bij oromandibulaire dystonie.

Werking

Haloperidol vermindert het effect van dopamine in de hersenen.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen komen vaak voor. Verder vooral in het begin slaperigheid, sufheid, duizeligheid, onverschilligheid, droge mond, wazig zien, verstopping, moeite met plassen. Zeer zelden: ernstige hartritmestoornissen.

Bijzonderheden

- Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. U mag de eerste dagen dat u het gebruikt niet autorijden. Alcohol of andere medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden versterken dit effect.
- Ouderen hebben meer last van bijwerkingen.
- Haloperidol bestaat ook in injectievorm met langdurige werking. Deze injectie met haloperidol-decanoaat werkt meestal vier weken lang.