

## ***Tetrabenazine (Tetmodis, Xenazine)***

### **Toedieningsvorm**

Tabletten

### **Toepassing**

Tetrabenazine is geregistreerd voor ongewilde overtollige bewegingen bij de ziekte van Huntington. Artsen schrijven het ook wel voor bij dystonie.

### **Werking**

Het vermindert verschillende boodschapperstoffen in de hersenen. Hierdoor verminderen de abrupte bewegingen. Hoe het precies bij dystonie werkt, is niet bekend.

### **Bijwerkingen**

Slaperigheid komt vaak voor, verder maagdarmklachten, duizeligheid, depressiviteit, verschijnselen die lijken op de ziekte van Parkinson, zoals stijve spieren, beven en een maskerachtig gezicht.

### **Bijzonderheden**

- Als na zeven dagen gebruik van de maximale dosis geen effect optreedt, heeft voortzetting van de toediening geen zin.
- Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. U mag de eerste dagen dat u het gebruikt niet autorijden. Alcohol of andere medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden versterken dit effect.
- Tetrabenazine mag niet tegelijk met antidepressiva van het MAO-remmertype worden gebruikt, zoals moclobemide (Aurorix). Na stoppen van de antidepressiva moet u nog twee weken wachten voordat u tetrabenazine mag gebruiken.
- Tetrabenazine kan de werking van levodopa (een middel tegen de ziekte van Parkinson) verminderen.